



г. Днепр,
ул.Шолом-Алейхема,4/26
(050)900-76-61
(096)551-75-65
www.jmc.org.ua

Рекомендации пациентам, проходящим курс безоперационного лечения геморроидальной болезни методом вакуумного лигирования латексными кольцами

1. Манипуляция, проведенная Вам, не сопровождается болью. Однако через несколько минут Вы можете испытывать давление в заднем проходе, ложные позывы к стулу и незначительные болевые ощущения в нижних отделах живота. Данные проявления могут продолжаться до нескольких часов. Необходимо принять спазмолитические препараты (Спазмолгон 2 таблетки, Спазмомен 1 таблетка), принимать не разжевывая, запить стаканом воды). При непродолжительном терапевтическом эффекте Дексалгин 1 саше (порошок) на ½ стакана воды однократно.

2. Через несколько дней, после установки лигатуры, возможны незначительные выделения крови из прямой кишки после стула. Это связано с отторжением струпа геморроидального узла. Повторное выделение крови возможно на 7 – 12 сутки. Это связано с отторжением лигатуры. Специальные лечебные процедуры при этом не нужны.

3. Рекомендуется:

- приём пищи богатой клетчаткой (200 – 300 гр. фруктов и варенных овощей в дополнение обычному суточному рациону);
- душ на перианальную область 28 – 30⁰С после стула и на ночь длительностью до 10 мин. С последующем нанесением ТРОКСЕВАЗИН гель.

4. В процессе лечения категорически запрещается:

- употребление спиртных напитков;
- употребление лекарственных средств, снижающих свёртываемость крови (аспирин, курантил, антикоагулянты);
- занятия спортом, повышающие внутрибрюшное давление (поднятие тяжестей, интенсивные нагрузки на тренажёрах), езда на велосипеде.